

### Implantologie

#### Vorbereidingen voor de operatie:

- Optimale mondhygiëne op de dagen vóór en na de ingreep
- Draag comfortabele kleding
- Eet goed voor de operatie
- Zorg voor ijs thuis voor na de operatie

#### Na de operatie:

- Leg ijs tegen de wang aan de kant waar geopereerd is in de eerste 48 uur na de operatie
- Eet zacht en koud in de eerste 48 uur na de operatie

#### Medicatie-schema:

	Amoxicilline 500 mg	Ibuprofen 600 mg	Corsodyl of Perio-Aid
Dag 1 (ingreep)	1 tabl. elke 8 uur	1 elke 8 uur	2x spoelen
Dag 2	1 tabl. elke 8 uur	1 elke 8 uur	2x spoelen
Dag 3	1 tabl. elke 8 uur	1 elke 8 uur	2x spoelen
Dag 4	1 tabl. elke 8 uur	Indien nodig 1	2x spoelen
Dag 5	1 tabl. elke 8 uur	Indien nodig 1	2x spoelen
Dag 6	-	Indien nodig 1	2x spoelen
Dag 7	-	Indien nodig 1	2x spoelen
Dag 8	-	Indien nodig 1	2x spoelen

#### Uitgebreide informatie medicijngebruik:

- Amoxicilline 500 mg (antibiotica): 3 maal daags 1 tablet met water innemen tijdens of na de maaltijd. Kuur afmaken! Beginnen op ochtend van de behandeling met 1<sup>ste</sup> tablet.
- Ibuprofen 600 mg (ontstekingsremmende pijnstillers): 3 maal daags 1 tablet innemen met water. 1 uur voor de operatie 1<sup>ste</sup> tablet innemen.
- Corsodyl of Perio-Aid (mondspoelmiddel): 2 maal daags gedurende 1 minuut de mond met 10 ml ( een tot de rand gevulde dop) spoelen, uitspuwen en niet naspoelen met water. Dag voor de operatie beginnen met spoelen. Heeft als bijwerking dat de tong bruin/zwart kan verkleuren, dit verdwijnt vanzelf.